

<保護者用>

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。  
(なお、登園のめやすは、お子様の全身状態が良好であることが基準となります。)

<b>登園届(保護者記入)</b>	
幼保連携型認定こども園新聞杉の子幼稚園長殿	園児名 _____
年 月 日 医療機関名「 _____ 」において	
病名「 _____ 」と診断されました。	
病状が回復し、集団生活に支障が無い状態と判断されましたので登園します。	
年 月 日	保護者指名 _____ 印

本園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぎすべての子どもが快適に生活できるように下記感染症の感染時においては、本登園届の提出をお願いいたします。

本登園届につきましては、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、子どもの健康状態が回復し、集団での生活が可能な状態になってからの登園であるようにご配慮ください。

尚、医師による登園許可が必要な感染症の場合は、本登園届ではなく、別紙登園許可書をお使い下さい。

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届の提出が望ましい感染症

病名	お友達に、感染しやすい期間	登園の目安
手足口病	手足や口腔内に水疱が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱の影響がなく、普段の食事がとれる
マイコプラズマ肺炎	手足や口腔内に水疱が発症した数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
伝染症紅斑(リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状焼失後1週間(量は減少しているが数週間ウイルスを排出しているので、注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり普段の食事がとれる
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱の影響がなく、普段の食事がとれる
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	全ての発疹がかさぶたになってから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後一日間	抗菌薬内服後24～48時間が経過していること
その他 ( )		

<保護者用> 書き方見本 ※赤字の所を記入してください

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。  
(なお、登園のめやすは、お子様の全身状態が良好であることが基準となります。)

<b>登園届(保護者記入)</b>		
幼保連携型認定こども園新聞杉の子幼稚園長殿	園児名	杉の子 太郎
令和 1 年 9 月 1 日	医療機関名「	鎌田医院 』において
病名「	溶連菌	』と診断されました。
病状が回復し、集団生活に支障が無い状態と判断されましたので登園します。		
令和1 年 9 月 1 日	保護者指名	杉の子 次郎 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">印</span>

本園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぎすべての子どもが快適に生活できるように下記感染症の感染時においては、本登園届の提出をお願いいたします。

本登園届につきましては、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、子どもの健康状態が回復し、集団での生活が可能な状態になってからの登園であるようにご配慮ください。

尚、医師による登園許可が必要な感染症の場合は、本登園届ではなく、別紙登園許可書をお使い下さい。

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届の提出が望ましい感染症

病名	お友達に、感染しやすい期間	登園の目安
手足口病	手足や口腔内に水疱が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱の影響がなく、普段の食事がとれる
マイコプラズマ肺炎	手足や口腔内に水疱が発症した数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
伝染症紅斑(リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウィルス等)	症状のある間と、症状焼失後1週間(量は減少しているが数週間ウイルスを排出しているので、注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり普段の食事がとれる
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱の影響がなく、普段の食事がとれる
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	全ての発疹がかさぶたになってから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後一日間	抗菌薬内服後24～48時間が経過していること
その他 ( )		